

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: ENDORSE® WDG			
FORMULACIÓN: Gránulos dispersables	pH DE LA FORMULACIÓN: 5.5 a 7.5	COLOR: Beige	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
% EN PESO		Polyoxin D sal de Zinc	
Ingrediente activo		FAMILIA QUÍMICA:	
Polyxin D sal de zinc (2-amino-5-O-carbamoil-2-deoxi-L-xilonamido)-1-(5-carboxi-1,2,3,4-tetrahidro-2,4-dioxopirimidin-1-il)-1,5-dideoxi-β-D-alofuranonato de zinc 11.3 (Equivalente a 113 g de i.a./kg)		Polioxinas	
Ingredientes inertes		FORMULA QUÍMICA:	
Surfactante y vehículo..... 88.7		C ₁₇ H ₂₃ N ₅ O ₁₄	
Total: 100.0			
MODO DE ACCIÓN: ENDORSE® WDG es un fungicida sistémico traslaminar cuyo ingrediente activo (Polyoxin D Sal de Zinc), es una fuerte sustancia fungistática que actúa inhibiendo la síntesis de glucan (Polisacárido) de los hongos, por lo consiguiente se detiene el crecimiento de la pared celular, inhibiendo el crecimiento del hongo y causando su destrucción final. Por su modo de acción ENDORSE® WDG es un fungicida preventivo que se debe aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. ENDORSE® WDG es considerado un fungicida biorracional.			
CATEGORÍA DE PELIGRO: 5 Precaución	RESIDUALIDAD: Moderadamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0302H-301-034-011	
USOS AUTORIZADOS:			
Cultivos	Enfermedad	Dosis g/ha	Recomendaciones
Fresa, Arándano, Frambuesa, Mora, Grosella, Zarzamora (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	400 a 800	Inicie las aplicaciones cuando aparezcan las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad, estas pueden presentarse durante la etapa vegetativa, floración y fructificación del cultivo. Realice 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días.
	Pudrición de raíz y cuello (<i>Rhizoctonia solani</i>)	750 a 1,500	Realice 2 aplicaciones en drench o al riego a intervalos de 14 días de manera preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas.
Jitomate, Chile, Chile Pimiento, Berenjena (0)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	750 a 1,000	Inicie las aplicaciones cuando aparezcan las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad, estas pueden presentarse durante la etapa vegetativa, floración y fructificación del cultivo. Realice 3 aplicaciones a intervalos de 6 a 7 días.
		Gladiolo (SL)	500 a 650
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento, Tomate de cáscara. (SL)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	750 a 1,000	Inicie las aplicaciones de manera preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas. Realice 2 aplicaciones en el sistema de riego o aplicación dirigida a los tallos a intervalos de 14 días.
Papayo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1,000	Realice 2 aplicaciones al follaje en la etapa de floración con un intervalo de 7 días cuando se presenten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. El volumen sugerido de aplicación es de 400 a 500 litros de agua/ha, sin embargo, se recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen correcto de agua.
Cultivos en condiciones de Agricultura Protegida	Enfermedad	Dosis g/ha	Recomendaciones
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Tizón del fuego (<i>Corynespora cassiicola</i>)	750 a 1,000	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Inicie las aplicaciones cuando se presenten las condiciones ambientales favorables al desarrollo de la enfermedad. El volumen sugerido de aplicación es de 550 a 650 litros de agua/ha, sin embargo, se recomienda realizar una calibración previa para determinar el volumen correcto de agua.
() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Sin Límite.			
Tiempo de reentrada: 4 horas después de la aplicación del producto.			
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Bolsa de 500 gr	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Bvd. Jesús Valdés Sánchez No.2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00	