

OrganoZYMA
amino®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Regulador del crecimiento vegetal, cuyo contenido rico en hormonas (derivadas de algas marinas) y otros compuestos orgánicos (derivados de extractos vegetales), han demostrado su seguridad y valor para aplicaciones agrícolas, ya que actúan como aceleradores de los procesos biológicos y eficientizan el uso de los fertilizantes, logrando con ello una mejor nutrición y desarrollo vegetal.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTES ACTIVOS			
Hormonas Vegetales			
Giberelinas (3,900 ppm)	0.39%	Citoquininas (6,200 ppm)	0.62%
Materiales Orgánicos			
Aminoácidos	3.67%	Acidos Húmicos	18.22%
Materia Orgánica	50.16%	Saponinas	20.90%
Macro y Micronutrientes			
Nitrógeno Total (N)	0.85%	Cobre (Cu)	1.643 mg/L
Nitrógeno Amoniacal (NH ₄ -N)	0.09%	Níquel (Ni)	ND
Fósforo Asimilable (P ₂ O ₅)	1.33%	Zinc (Zn)	1.408 mg/L
Potasio (K ₂ O)	1.53%	Cadmio (Cd)	ND
Azufre (S)	0.035%	Plomo (Pb)	0.099 mg/L
Magnesio (Mg)	650.00 mg/L	Mercurio (Hg)	ND
Manganeso (Mn)	0.57 mg/L	pH	4
Hierro (Fe)	26.34 mg/L	Diluyentes	3.40%
Calcio (Ca)	0.08%	Total	100%
AUSENCIA DE PATÓGENOS			
<i>Salmonella</i> sp (en 25 gr)	Negativo	Estreptococos fecales	<10 UFC/g
<i>Shigella</i> sp (en 15 gr)	Negativo	Enterobacterias totales	Negativo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido color café oscuro con olor a melaza.

INDICACIONES DE USO

Hortalizas : 0.5 Lt/Ha 20 días después de la siembra; 1.5 Lt/Ha al inicio de la floración; 2.0 Lt/Ha para amarre de frutos.

Frutales y viveros : 0.5 Lt/Ha en etapa no productiva; 1.5 Lt/Ha al inicio de la floración; 1.5 Lt/Ha amarre de frutos.

Estimulantes, oleaginosas y leguminosas: 0.75 Lt/Ha al inicio de la floración; 0.75 Lt/Ha para amarre de frutos y vainas.

Caña de azúcar: 1.5 Lt/Ha 15 días después de la siembra; 1.5 Lt/Ha 30 días después de la primera aplicación.

Cereales: 1.0 Lt/Ha 15 días después de la siembra; 0.5 Lt/Ha 30 días después de la primera aplicación.

Semillas : 10 mL/ 1 Lt de agua (remojar las semillas mínimo 3 horas antes de la siembra; para forestales y semillas de difícil germinación, el remojo es de 20 horas).

Raíces : 10 mL/ 1 Lt de aguas (remojar las raíces durante 10 minutos antes del transplante; lo que quede de la solución, asperjarlo sobre la plantita recién transplantada).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar goggles, guantes de plástico y mandil durante su manejo. Evite el contacto con los ojos. No se ingiera el producto. No se almacene cerca de los alimentos ni se deje cerca del alcance de los niños.

COMPATIBILIDAD

OrganoZYMA amino es compatible con la mayoría de los agroquímicos existentes, pero se recomienda mínimo una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

EMPAQUE

Disponible en envases de polietileno de alta densidad y alto peso molecular de 250 mL, 500 mL, 1 Lt, 5 Lt y 20 Lt.

ALMACENAMIENTO

Envases cerrados, en lugar seco y a temperatura ambiente.

OrganoZYMA amino. REVISIÓN : JUNIO DE 2019.