

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: ROLLING® 720			
FORMULACIÓN: Suspensión concentrada acuosa	pH DE LA FORMULACIÓN: 6.5 a 9.5 (sol. 1%, 25°C)	COLOR: Gris claro	SOLUBILIDAD EN AGUA: Misible
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
% EN PESO		Clorotalonil	
Ingrediente activo		FAMILIA QUIMICA:	
Clorotalonil		Cloroftalonitrilos	
Tetracloroisoflato-nitrilo 54.0 (Equivalente a 720 g de i.a./L a 20° C)		FORMULA QUIMICA:	
Ingredientes inertes		C ₈ Cl ₄ N ₂	
Anticongelante, surfactante, ablandador, agente suspensor, conservador, antiespumante y diluyente 46.0			
Total..... 100.0			
MODO DE ACCIÓN: ROLLING® 720 es un fungicida de amplio espectro y gran eficacia preventiva para el control de numerosas enfermedades fúngicas en diversos cultivos, especialmente eficiente su uso cuando coexisten dos o más enfermedades en el cultivo. ROLLING® 720 es un fungicida posee acción no específica multi-sitio, por lo que ataca y destruye diversas funciones celulares, lo que retrasa la aparición de resistencia al ingrediente activo.			
CATEGORÍA DE PELIGRO: 4 Precaución	RESIDUALIDAD: Moderadamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0309-317-026-054	
USOS AUTORIZADOS:			
Cultivos	Enfermedades	Dosis Litros/ha	Recomendaciones
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Chile pimiento, Tomate de cáscara (7)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.75 a 2.0	Aplique de forma preventiva cuando las plantas se encuentren en sus primeras hojas verdaderas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. En caso de ser necesario, realice 4 aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía (0)	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.0	Aplique de forma preventiva cuando las plantas se encuentren en sus primeras hojas verdaderas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. En caso de ser necesario, realice 2 aplicaciones adicionales a intervalos de 7 días.
Plátano (14)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	2.0	Aplique de forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realice 3 aplicaciones a intervalos de 14 días entre cada aplicación.
Papayo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 a 2.0 Litros en 400 litros de agua	Aplique de forma preventiva cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realice 3 aplicaciones a intervalos de 14 días entre cada aplicación.
() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.			
Tiempo de reentrada: 12 horas después de aplicado el producto			
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Garrafa de 10 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	