

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nombre del Producto: | SAPROL DC |
| 2. Uso: | FUNGICIDA |
| 3. Ingrediente Activo: | TRIFORINE, 190 g/L |
| 4. Grupo Químico: | PIPERAZINA |
| 5. Usos: | Rosa, Frijol y Café |
| 6. Categoría Toxicológica: | II Moderadamente Peligroso |
| 7. Formulación: | CONCENTRADO DISPERSABLE DC |
| 8. Registro Nacional ICA #: | 1906 |
| 9. Empresa Titular: | Summit Agro Colombia S.A.S. |
| 10. Presentaciones: | Frascos plásticos de 100, 250, 500 cc y 1Lt. |
| 11. Mecanismo de Acción: | Inhibe la síntesis de ergosterol. |
| 12. Modo de Acción: | |
- Fungicida de acción por contacto, translaminar o parcialmente sistémico.
- Tras su aplicación por vía foliar, SAPROL actúa en forma preventiva y curativa. Penetra y se transporta hacia distancias cortas. La TRIFORINA es capaz de inhibir la síntesis de ergosterol en los organismos fúngicos sensibles, ocasionando la degradación y ruptura de sus membranas mitocondriales, frenando su respiración.
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 13. Apariencia: | LÍQUIDO ÁMBAR CLARO TRASLÚCIDO. |
|------------------------|---------------------------------|

14. Recomendaciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis y Volumen de Agua	Período de Carencia	Período de Reentrada
Rosa	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.25 a 1.50 c.c./litro (en 1200 Lt agua/ha)	No Aplica	12 Horas
Fríjol	Mildeo polvoso (<i>Erysiphe polygoni</i>)	0.9 L/ha (en 500 Lt agua/ha)	10 días	
Café	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.6 L/ha (en 400 Lt agua/ha)	21 días	

15. Frecuencia y época de aplicación:

Rosa: Aplicar 1.25 cc/L cuando se presente incidencia inicial menor al 26% y aplicar 1.50 cc/L cuando la incidencia inicial sea mayor 26%.

Fríjol: Realizar de 1 a 2 aplicaciones con la aparición de las primeras infecciones en el lote. Realizar máximo 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Café: Realizar 1 aplicación con la aparición de las primeras infecciones en el lote.

16. Compatibilidad y Fitotoxicidad

Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes, coadyuvantes o reguladores fisiológicos efectuadas con SAPROL DC deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar la compatibilidad de la mezcla y la afinidad con las plantas. Dichas mezclas siempre deben ser usadas inmediatamente después de su preparación y no deben ser conservadas de un día para otro.

SAPROL DC no es fitotóxico cuando se aplica en el cultivo y a las dosis indicadas

Categoría Toxicológica: II (Moderadamente Peligroso - Dañino)

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo.

**Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.
Calle 113 # 7-21 oficina 1111. Tel. (57-1) 3809070. Fax: (57-1) 629 2282.
Bogotá, D. C. Colombia.**