

HUMIFERT®

Nutriente Foliar Completo + Ácidos Orgánicos.

Composición Porcentual

Elementos Mayores		Microelementos		g/l
Nitrógeno (N)	10 %	Hierro (Fe)	0.60	
Fósforo (P2O5)	5 %	Zinc (Zn)	0.80	
Potasio (K2O)	5 %	Manganeso (Mn)	0.40	
		Cobre (Cu)	0.40	
Ácidos Húmicos	3 %	Molibdeno (Mo)	0.01	
		Boro (B)	0.01	
		Elementos Secundarios		
		Azufre (S)	1.50	
		Calcio (Ca)	0.25	
		Magnesio (Mg)	0.25	

Aspecto Físico: Líquido.

Compatibilidad

Humifert es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, pero es conveniente hacer pruebas de compatibilidad cuando existan dudas al mezclarlo.



Información general

Humifert es un nutriente foliar completo enriquecido con ácidos húmicos, sustancia orgánica natural que ayuda en la absorción de nutrientes aplicados al follaje. Los elementos menores contenidos en Humifert se encuentran en forma quelatada.

Humifert contribuye en el crecimiento, desarrollo y fructificación de los cultivos, al asegurar un buen suministro de alimento dando la oportunidad de obtener mejores rendimientos y calidad de frutos. Ayuda también, al rápido restablecimiento de las plantas afectadas por el estrés causado por plagas, enfermedades, bajas temperaturas y otros factores climatológicos.



HUMIFERT®

Recomendaciones

Las dosis van de acuerdo a la edad y al área foliar de los cultivos. En general, es mejor aplicar dosis bajas o medias en varias ocasiones, que una sola aplicación en dosis altas.

CULTIVO	Dosis (l./Ha.)	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Algodón	2 a 3	Iniciar con dosis bajas, cuando exista follaje suficiente. Aumentar la dosis al aparecer los primeros capullos. Realizar dos aspersiones más, cada 20 días.
CUCURBITÁCEAS (Melón, pepino, calabaza, sandía)	2 a 4	Iniciar a los 15 días después de la emergencia. Seguir con 1 ó 2 aplicaciones en prefloración. Hacer 2 aplicaciones más entre cortes.
	2 a 4	Cuando la planta tenga aproximadamente 20 cm. Asperjar nuevamente en tuberización y a los 15 días después.
Tomate, pimiento, berenjena	2 a 4	A los 15 días del transplante, usar dosis bajas. Realizar 2 aspersiones más, antes de la floración y 2 más durante la fructificación.
HORTALIZAS (lechuga, brócoli, zanahoria, repollo)	2 a 4	A los 15 días del transplante. En siembra directa, cuando exista follaje suficiente. Continuar con aplicaciones cada 15 o 20 días, hasta un máximo de 5 aplicaciones en total.
FRUTALES (manzano, nogal, cítricos, vid)	2 a 5	En árboles pequeños: aplicaciones cada mes. En árboles grandes y vid: en prefloración y cuando el fruto esté en desarrollo.
ORNAMENTALES	1 litro c/200 l. de agua.	Aplicar en pleno desarrollo y en prefloración.
VIVEROS, SEMILLEROS y ALMÁCIGOS	20 a 30 cc c/10 l. de agua.	Aplicaciones cada 15 días.



diseño Patricia Ruiz

Recomendaciones particulares

 **Cosmoflor**
LA SOLUCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN

Informes: Calle de la Semillería 1315 - (5012) Córdoba - ARGENTINA
Telefax +54 (351) 496-2200 - info@cosmoflor.com.ar - www.cosmoflor.com.ar