



AMINO VEGETATIVE SC

Speedfol® Amino Vegetative SC es una solución concentrada de NPK + azufre + microelementos, enriquecidos con aminoácidos y extractos vegetales. Promueve el crecimiento radicular y desarrollo temprano de la planta. En aplicación de post cosecha, restituye las reservas de nutrientes para la próxima temporada. Sus aminoácidos son de rápida absorción por la planta.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Suspensión concentrada

Densidad: 1480 g/1L

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Nitrógeno (N)	16,5% p/p
Fósforo (P ₂ O ₅)	7,6 % p/p
Potasio (K ₂ O)	11,7% p/p
Azufre (S)	0,9 % p/p
Boro (B)	0,101 % p/p
Zinc (Zn) - EDTA	0,051 % p/p
Mangneso (Mn) - EDTA	0,021 % p/p
Molibdeno (Mo)	0,005 % p/p
Hierro (Fe) - EDTA	0,051 % p/p
Aminoácidos	0,8% p/p
Auxinas	0,41 ppm p/p
Citoquininas	1,35 ppm p/p



3. VENTAJAS

- ✓ Promueve el enraizamiento.
- ✓ Completo contenido de nutrientes.
- ✓ Partículas de bajo peso molecular.
- ✓ Contiene adyuvantes para prevenir el lavado.
- ✓ Apoyo regulador del crecimiento de plantas.
- ✓ Nivel de pH del producto adecuado para aplicación foliar.
- ✓ No es fitotóxico en la dosis recomendada.

AMINO VEGETATIVE SC

4. CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Máx ml / 100L agua	L/ ha	¿Cuándo aplicar?
Ajos, apio, brócoli, cebollas, coliflor, crucíferas, lechuga, pepinos, pimentón, porotos, repollo, sandías, tomate, zanahoria, zapallo	350	2	Aplice después del establecimiento, semanalmente hasta que el cultivo haya desarrollado suficiente masa foliar para asegurar altos rendimientos. Repita según sea necesario y no aplique después de el inicio de la floración.
Arándanos, Frambuesa, frutilla	350	3	Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo, repita según sea necesario,
Carozo (cerezas, ciruela, durazno, nectarin)	350	5	Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo y/o 2 aplicaciones en post cosecha temprana para restituir las reservas nutricionales para la próxima temporada e incrementar desarrollo de brotes.
Cereales (trigo, cebada, avena)	1000	2	Aplice durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea necesario.
Cítricos	350	5	Aplicar en 30% de brotación de primavera. 1 a 2 aplicaciones separadas una semana.
Empastados	1000	3	Aplice 1 a 2 semanas antes del corte para incrementar niveles de proteína. 1 a 2 semanas después del corte para incrementar producción de forraje.
Frutales en formación	500	3	Aplicar durante el crecimiento de primavera, repetir cada 15 días.
Maíz y Maravilla	500	3	Aplice durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea necesario.
Manzano y pera	350	5	Aplicar 1 a 2 semanas de intervalo durante el desarrollo vegetativo y/o post cosecha para restituir las reservas de nutrientes para la próxima temporada.
Paltos	350	5	Aplicar sobre tejido no lignificado en otoño, para promover desarrollo vegetativo. Evite aplicar en sectores propensos a heladas. 1 a 2 aplicaciones, separados 7 días.
Papas y remolacha	500	3	Aplice durante el crecimiento vegetativo hasta inicio de floración, repita según sea necesario.
Uva de Mesa, vinífera y pisquera.	350	5	Aplicar 1 a 2 veces previo a la floración, repetir post cuaja si aún hay problemas de cubrimiento. En post cosecha aplique para restituir las reservas de nutrientes para la próxima temporada.

Antes de usar este producto, por favor lea sus especificaciones, Hoja de Seguridad y demás literatura relacionada con el producto. El uso y aplicación que haga de nuestros productos, la asistencia técnica e información (verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producto), incluyendo cualquier sugerencia de formulación o recomendación, están fuera de nuestro control. Por lo tanto es imperativo que pruebe nuestros productos, la asistencia técnica e información con el fin de determinar si se ajustan al uso o aplicación que pretende darles. El análisis de la aplicación – específica debe al menos incluir una prueba para determinar la adaptabilidad del producto desde un punto de vista tanto técnico, como de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No es recomendable que el producto se utilice para cualquier propósito sin antes verificar que cumple con leyes, reglamentos y requerimientos de registro. No se garantiza la exactitud de la información acá contenida. A pesar que el producto se entrega en buena fe, se provee al comprador sin representación o garantía expresa o implícita, referente a calidad, estado, utilidad, mercadeo, integridad, idoneidad o adaptabilidad a cualquier uso o propósito en particular, o cualquier otro asunto, y sin recurso contra SQM bajo ninguna circunstancia.

Sin limitar la generalidad de lo expuesto, SQM no se responsabiliza del uso dado al producto y, bajo ninguna circunstancia, será culpable de daños especiales, incidentales o consecuenciales derivados de dicho uso.