

Picloram + 2,4-D Amina

Familia: Herbicida

Uso: Agrícola

Formulación: Concentrado Soluble

Registro: RSCO-HEDE-0247-0704-032-90



Herbicida selectivo y sistemático en hoja ancha, que inhibe rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimiento y susceptibilidad. Las malezas no presentarán síntomas iniciales de fitotoxicidad, pero su actividad y competencia con el cultivo es nula.

Características agronómicas:

PICLORPAC es un herbicida selectivo sistémico de acción hormonal que se aplica en post emergencia en cereales, caña de azúcar, lino y praderas artificiales de gramíneas, campos naturales, en cercos, alambrados, vías férreas y carreteras, que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas. El herbicida es absorbido por la maleza por vía foliar y radicular y se transloca hacia los meristemas que es donde ejerce su acción. Controla malezas de hoja ancha, anuales y perennes.

Composición Porcentual:

| INGREDIENTES ACTIVOS | % EN PESO |
|--|-------------------------------|
| PICLORAM: 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2 Ácido carboxílico. (Equivalente a 64 g de i.a. / L a 20°C)..... | NO MENOS DE: 5.55% |
| 2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-D No menor de 83%. (Equivalente a 240 g de i.a. / L a 20°C)..... | NO MENOS DE: 20.82% |
| INGREDIENTES INERTES | NO MÁS DE: |
| Neutralizador, surfactante y agua..... | 73.63% |
| TOTAL: 100% | |

Usos:

PICLORPAC es recomendado para el control de las siguientes malezas: Escobilla, Dormilona, Verdolaga y Hierba Martina. No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones.

"Antes de usar este producto, por favor lea la información de la etiqueta".

| CULTIVO | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES |
|--|--------------|--|
| Pastizales establecidos en potreros (14) | 1.5 – 2.0 | Realizar una aplicación total en postemergencia a la maleza y al cultivo, debe aplicarse en pastos establecidos en potreros. |

| MALEZA |
|--|
| NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO |
| Escobilla (<i>Sida cuta</i>) |
| Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) |
| Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) |
| Hierba Martina (<i>Yptis verticillata</i>) |

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la entrada de ganado.
 Tiempo de reentrada: 48 Horas después de la aplicación.

Formas de aplicación:

Antes de usar el producto agite el envase, abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de vertir el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **PICLORPAC** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme, sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.
 No aplique **PICLORPAC** cuando la temperatura sea muy elevada o existan vientos con velocidad mayor de 15 km/h. No aplicar en condiciones de sequía o terrenos inundados, evite el pastoreo por lo menos dos semanas después de la aplicación para ayudar a la recuperación del potrero.

Almacenamiento y seguridad:

No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 12 horas de aplicado el producto.
 Evite contacto con los ojos y piel utilice equipo de protección: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

Fecha de revisión: 03/05/2021



Importante:

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Insecticidas del Pacífico S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad, aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asume los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuenciales.